

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК.

(приказ МЗ РФ от 21.03.2014 года №125н)

Возраст	24 ч.	3-7 дн.	1 мес.	2 мес.	3 мес.	4,5 мес.	6 мес.	12 мес.	15 мес.	18 мес.	20 мес.	6 лет	6-7 лет	14 лет
Туберкулез		V											RV	
Коклюш, дифтерия, столбняк					V1	V2	V3			RV1			RV2	RV3
Полиомиелит					V1	V2	V3			RV1	RV2			RV3
Корь, краснуха, паротит								V				RV		
Гепатит В	V1		V2	V3*			V3	V4*						
Гемофильная инфекция					V1*	V2*	V3*			RV*				
Пневмококковая инфекция				V1		V2			RV					
Грипп							С 6 мес.							
Возраст	24 ч.	3-7 дн.	1 мес.	2 мес.	3 мес.	4,5 мес.	6 мес.	12 мес.	15 мес.	18 мес.	20 мес.	6 лет	6-7 лет	14 лет

## Примечания:

1. Вакцинация против туберкулеза проводится щадящей вакциной БЦЖ-М, ревакцинация проводится вакциной для профилактики туберкулеза БЦЖ..
2. Вакцинация против вирусного гепатита В проводится по схеме 0-1-6; для детей, относящихся к группе риска (на таблице \*) схема вакцинации 0-1-2-12. К группе риска относятся дети: родившиеся от матерей носителей HBsAg, больных вирусным гепатитом В или перенесших вирусный гепатит В в третий триместр беременности, не имеющих результатов обследования на маркеры гепатита В, употребляющих наркотические или психотропные средства, из семей, в которых есть носитель HBsAg или больной острым вирусным гепатитом В и хроническими вирусными гепатитами.
3. Вакцинация против гемофильной инфекции проводится детям, относящимся к группе риска (на таблице \*): с иммунодефицитными состояниями или анатомическими дефектами, приводящими к резко повышенной опасности заболевания гемофильной инфекцией; с онкогематологическими заболеваниями и/или длительно получающие иммуносупрессивную терапию; детям, рожденным от матерей с ВИЧ-инфекцией, детям, находящимся в домах ребенка.
4. Полиомиелит: первая и вторая вакцинация проводится вакциной для профилактики полиомиелита инактивированной, третья вакцинация и последующие ревакцинации против полиомиелита проводятся детям вакциной для профилактики полиомиелита живой; детям рожденным от матерей с ВИЧ-инфекцией, детям с ВИЧ-инфекцией, детям, находящимся в домах ребенка – инактивированной полиомиелитной вакциной.
5. Вакцинация детей, которым иммунопрофилактика против пневмококковой инфекции не была начата в первые 6 месяцев жизни, проводится двукратно с интервалом между прививками не менее 2 месяцев.